

感染ニュースすみれ

第 75 号 公立相馬総合病院
院内感染対策委員会
感染リンクナース会

ひやくにちせき 百日咳とは

百日咳菌の感染によって、特有のけいれん性の激しい咳を
特徴とする急性の気道感染症です

1 歳未満、とくに生後 6 か月未満では重症化する危険が高く

生後 1 ヶ月の乳児が亡くなった例が報告されています

主な症状は

経過が 3 期に分けられます。治るのに 2～3 カ月かかります



百日咳のセルフチェックリスト！

- ☐ 2 週間以上、咳だけが続いている
- ☐ だんだん咳がひどくなってきた
- ☐ 咳き込みすぎて吐いてしまう、眠れない
- ☐ 「コンコンコン！」と激しく連続で咳き込む



感染経路

※「飛沫」とは、感染者の
せきやくしゃみなどを吸い
込むことを言います

飛沫感染



感染者からの飛沫が飛び散り
その飛沫を吸い込むことで
感染してしまう

接触感染



感染者と直接接触、または
汚染された場所や物に接触し
その後自分の目や鼻、口を触る
ことで感染してしまう

基本的な感染対策が大切です

検 査 医師の指示のもとで行います

検査法	抗原検査	培 養	遺伝子検査
検 体	鼻咽頭ぬぐい液	鼻咽頭ぬぐい液	鼻咽頭ぬぐい液
検査時間	15 分	約 1 週間	3 日～5 日

★当院では当日結果がわかる「抗原検査」を導入しました

(検査の詳細については職員にお尋ねください)

治療方法

★抗菌薬を投与

★咳が激しい場合には咳止め等の対症療法

予防と対策

★生後 2 ヶ月から受けられる 5 種混合ワクチン (生後 2 か月から生後 90 か月まで)

★うがい・手洗い

★マスクの着用

